

# 服用复胃散胶囊和强骨生血口服液预防胃癌术后化疗病人副反应的效果观察

申慧,袁瑞林,袁春妮

**摘要:**[目的]观察服用复胃散胶囊和强骨生血口服液预防胃癌术后化疗病人副反应的效果。[方法]选取胃癌术后化疗病人61例,随机分为两组,实验组32例,对照组29例,实验组应用复胃散胶囊和强骨生血口服液,对照组应用养血归脾丸和强骨生血口服液。观察并比较两组病人化疗副反应发生情况。[结果]实验组化疗副反应发生率明显低于对照组( $P<0.05$ )。[结论]复胃散胶囊合强骨生血口服液可降低胃癌术后化疗病人的副反应。

**关键词:**复胃散胶囊;胃癌;化疗;副反应

中图分类号:R473.73

文献标识码:C

文章编号:1672-1888(2008)5A-1160-01

目前,胃癌在我国消化系统肿瘤的发病率呈上升趋势。胃癌根治术后行化疗是目前常用的治疗方案。资料显示,胃癌术后化疗病人多出现白细胞数下降、血小板数下降、恶心呕吐、脱发、肝功能异常等多种副反应<sup>[1]</sup>。为减轻胃癌术后化疗病人的副反应,我科对胃癌术后化疗病人应用中药复胃散胶囊合强骨生血口服液,效果满意。现报告如下。

## 1 资料和方法

1.1 一般资料 选取胃癌术后化疗病人61例,男33例,女28例;年龄33岁~70岁;乳头状腺癌25例,管状腺癌14例,其他22例;随机分为两组,实验组32例,对照组29例,两组病人治疗前均排除复发或转移。两组病人年龄、病情等比较差异无统计学意义( $P>0.05$ ),具有可比性。

## 1.2 方法

1.2.1 用药方法 实验组应用复胃散胶囊合强骨生血口服液,复胃散胶囊(山西省云鹏药业有限公司)每次4粒,每日3次,口服。强骨生血口服液(湖南新生命药业有限公司生产)每次10mL,每日3次,口服。均以7d为1疗程。对照组应用养血归脾丸,每次1丸,每日2次,口服,强骨生血口服液用法同治疗组。

1.2.2 观察指标 观察并比较两组病人化疗副反应发生情况,包括白细胞数下降、血小板数下降、恶心呕吐、脱发、肝功能异常。

1.2.2 统计学方法 计数资料采用 $\chi^2$ 检验

## 2 结果(见表1)

## 3 讨论

胃癌是我国近年来高发肿瘤之一,胃癌病人根治

表1 两组病人化疗副反应发生情况比较 例(%)

| 组别  | 例数 | 白细胞下降    | 血小板下降    | 恶心呕吐     | 脱发       | 肝功能异常   |
|-----|----|----------|----------|----------|----------|---------|
| 治疗组 | 32 | 11(34.4) | 10(31.3) | 14(43.8) | 5(15.6)  | 5(15.6) |
| 对照组 | 29 | 18(62.1) | 16(55.2) | 19(65.5) | 11(37.9) | 9(31.0) |

注: $P$ 均 $<0.05$ 。

术后行化疗已成为临床共识。但胃癌术后化疗病人可能出现多种副反应,包括白细胞数下降、血小板数下降、恶心呕吐、脱发、肝功能异常等。《黄帝内经》云:“正气充内,邪不可干”,“邪之所凑,其气必虚”。人体是以正气为本,邪气为标,在攻邪时必须考虑病人体质抵抗力的问题。中医学认为胃癌手术和化疗均损伤人体正气,可导致神疲乏力、少气懒言、食欲不振、自汗、头晕、恶心呕吐、脱发等症状。复胃散胶囊由黄芪、白芷、白芨、延胡索(醋制)、白芍、海螵蛸、甘草(蜜制)七味中成药合制而成,具有补气健脾养血,制酸止痛之功效。强骨生血口服液具有益气生血,滋补肝肾,填髓壮骨之功效。现代药理学研究有扶正固本,提高免疫功能作用,二药配合对胃癌术后所致的正气亏虚的病证,有良好疗效<sup>[2]</sup>。本研究亦显示复胃散胶囊合强骨生血口服液可降低胃癌术后化疗病人的副反应,提高病人的生存质量。

## 参考文献:

- [1] 周爱萍,王奇潞.抗肿瘤药物对消化系统的不良反应及其防治[J].实用肿瘤杂志,2002,17(2):79.
- [2] 韩锐.肿瘤化学预防与药物治疗[M].北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,2001:1.

作者简介 申慧、袁瑞林、袁春妮工作单位:033000,山西省吕梁市人民医院。

(收稿日期:2008-03-08)

(本文编辑 王钊林)